


PTAKI

Parku Krajobrazowego
"Dolina Baryczy"

RYBITWY



STAWY MILICKIE- KOMPLEKS POTASZNIA
MIEJSCE OBSERWACJI RYBITWY



Fot. Piotr Śnigucki



Dolnośląski Zespół
Parków Krajobrazowych,
ul. Puszczykowska 10,
50-559 Wrocław
www.dzpk.pl
Wrocław 2015



Rybitwa czarna (*Chlidonias niger*)

Black tern, Guifette noire, Trauerseeschwalbe

Śmiały, zwinny łowca unoszący się nad powierzchnią wody. Gdy poluje w dużej grupie, przypomina nieco swym zachowaniem jaskółkę. Nawet jej łacińska nazwa pochodzi od jaskółki. Jest niewielkim, dosyć ciemno upierzonym ptakiem. W odróżnieniu od innych, „jaśniejszych” rybitw ma krótszy ogon i krótsze skrzydła.



Fot. Zdzisław Rogowski Rybitwa czarna

Zazwyczaj wydaje ostre, nosowe dźwięki brzmiące jak „kik” lub krótkie, nosowe „kjek”. Potrafi zawisnąć nad taflą stawu, trzepocząc szybko skrzydłami, aby zebrać zgromadzone na niej owady. Niezwykle gniazdo - pływające - jest budowane przez obydwu partnerów na kobiercach pływającej roślinności wodnej. Najlepszym do tego miejscem są skupiska osoki aloesowatej, tworzące zielony dywan, ale mogą to też być połamane trzciny. Wybiera taką lokalizację, aby gniazdo było chronione przed falowaniem wody. Budulcem są części roślin. Dla zwiększenia bezpieczeństwa gniazdują w niezbyt licznych koloniach lęgowych, zakładając gniazda w odległości kilku metrów jedno od drugiego. Ich sąsiadami często są inne gatunki rybitw lub nawet mewy.

Gniazdo jest bardzo płytkie i bywa przemoczone. Samiec i samica wysiadują jaja na zmianę. Pisklęta zaczynają latać po około 25 dniach od wyklucia i szybko się usamodzielniają.



Fot. Zdzisław Rogowski Rybitwa rzeczna

Na Stawach Milickich prócz rybitwy czarnej występują również:

- rybitwa białowąsa (*Chlidonias hybridus*)
- rybitwa białoczelna (*Sterna albifrons*)
- rybitwa białoskrzydła (*Chlidonias leucopterus*)
- rybitwa rzeczna (zwyczajna) (*Sterna hirundo*)

Pokarm:

W czasie lęgów przeważnie owady - jętki, ważki, ochatki. Zdecydowanie rzadziej łowi nieduże rybki, pijawki, niewielkie płazy i ich kijanki.

Waga:

50 g - 75 g

Rozpiętość skrzydeł:

60 cm - 67 cm

Ilość jaj:

2 - 3 sztuki

Okres wysiadywania jaj:

14-17 dni

Długość życia:

Do 17 lat

Najlepszy czas do obserwacji:

kwiecień - październik

Przeloty:

kwiecień - wrzesień

Ciekawostki:

Zdarza się, że poluje na łądzie - na owady oraz na dżdżownice. Jej gniazdowanie jest silnie zależne od obecności pływającej roślinności - aby zapewnić odpowiednie miejsce ornitology budują niewielkie, pływające na płyciźnie ramki wypełnione częściami roślin.



Fot. Leszek Matacz